

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



MERCOBLOC STANDARD

DESCRIPCIÓN

Suplemento de minerales y vitaminas en bloques de lamer con concentración media de macro y micro minerales de alta disponibilidad, con el agregado del optimizador ruminal CALSEAGRIT (CalseaPowder - producto orgánico derivado de algas marinas) para favorecer un mejor funcionamiento y ambiente ruminal, mejorando el aprovechamiento de los alimentos y minerales. INDICADO PARA GANADO BOVINO Y OVINO.

PRESENTACIÓN



Balde (Bloques 25 kg)

COMPONENTES

Azufre, Carbonato de Calcio, Cloruro de sodio, Iodato de calcio, Fosfato mono y/o bicálcico, Óxido de Magnesio, Óxido y/o Sulfato de Zinc, Selenito de sodio, Sulfato de cobalto, Sulfato de cobre, Sulfato de Manganeso. Aromatizante, antioxidante, secuestrante de micotoxinas, Lithothamne y/o Calseagrit y/o Calsea Powder Original y/o Calsea Powder Advance, Vitamina A, y E. Expeller de girasol y/o expeller de soja y/o expeller de canolay/o expeller de nabo y/o burlanda de maíz, afrecho de arroz y/o afrecho de trigo y/o cascarilla de soja, melaza de caña y/o glicerol.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Macrominerales	Mínimo (%)	Máximo (%)	Microminerales	Mínimo (ppm)
Cálcio	9	12	Cobalto	20
Fósforo	4,0		Cobre	500
Magnesio	1,0		Hierro	500
Sódio	15	20	Manganeso	500
Azufre	1,0		Selenio	8
			Zinc	2.000
			Yodo	50
VITAMINAS				
Vitamina A			10.000	
Vitamina D			2.000	
Vitamina E			25	

OTRAS INFORMACIONES

HUMEDAD MÁXIMA: 12%

MÁXIMO DE CENIZAS INSOLUBLES al HCl: 4,5%

NaCl : 35-40%

MÍNIMO DE MINERALES TOTALES: 85%

MÁXIMO MINERALES TOTALES: 95%

VALIDEZ: 18 MESES

Tecnología



INDICACIÓN Y MODO DE USO

Indicación: ganado bovino y ovino de requerimientos medios a bajos y/o con pasturas o dietas de alimentos de buena calidad

Modo de uso: colocar los bloques en el campo bien separados entre sí.

BOVINOS: a razón de 1 bloque cada 25 animales adultos.

Consumo orientativo: 50 a 80 gr/animal/día, el consumo en la adaptación puede ser mayor.

OVINOS: 1 bloque a cada 60 animales adultos cerca de bebederos, dormideros y/o sombra.

Consumo orientativo: 10 a 15 g/animal/día, el consumo en la adaptación puede ser mayor.

NO DESMOLDAR el bloque, en días de lluvia volcar el balde para retirar el agua acumulada.

Elaborado por Timac Agro Paraguay S.A. Ruta 7. Km 20, Minga Guazu, Alto Paraná, Paraguay.

Tel: +595 (61) 573 112/573 119